



PAS DE TEMPS À PERDRE !

**Protégez la vie
de vos bébés –
faites-leur
faire le test
du VIH**

En tant que parents et soignants nous voulons prendre soin de nos enfants du mieux que nous pouvons - cela inclut le fait de les protéger contre le VIH. Voici ce que vous devez savoir :

« Comment notre bébé pourrait-il contracter le VIH ? »

Les bébés peuvent entrer en contact avec le VIH pendant la grossesse, au moment de leur naissance ou pendant l'allaitement, en particulier si la mère ne sait pas qu'elle est séropositive ou si elle n'est pas sous traitement.

« Mais notre bébé est en bonne santé »

Votre bébé peut sembler en bonne santé, mais il n'y a pas toujours de symptômes au début. Le VIH est dangereux chez les jeunes enfants et ils peuvent tomber malades très rapidement. Le seul moyen de savoir avec certitude si votre bébé est séropositif est de le faire tester.

« Où pouvons-nous faire tester notre bébé ? »

Parlez-en à n'importe quel agent de santé ou conduisez votre bébé au centre de santé le plus proche et demandez le test.

« Que se passe-t-il au moment du test ? »

Un agent de santé pique le pied de votre bébé à l'aide d'une épingle et prélève une goutte de sang à analyser. Certains centres de santé peuvent vous donner les résultats le jour-même, et dans d'autres centres de santé l'échantillon est envoyé ailleurs pour être analysé et vous devez revenir plus tard pour avoir les résultats. Il est très important de récupérer les résultats pour savoir si votre bébé a le VIH.

« Et si notre bébé a le VIH ? »

Le bébé peut être mis sous traitement immédiatement. Tous les soins et les médicaments dont il aura besoin sont gratuits.

Le traitement du VIH est très efficace. Plus tôt votre enfant sera diagnostiqué, plus tôt il pourra commencer le traitement. Si votre enfant est diagnostiqué tôt et qu'il prend ses médicaments, il peut grandir et vivre longtemps, en bonne santé.

« Notre bébé a été testé et il n'a pas le VIH »

C'est une très bonne nouvelle, mais les enfants peuvent être encore exposés au VIH pendant l'allaitement. Il est important de lui faire refaire un nouveau test quand il aura 9 mois et également à la fin de la période d'allaitement.

SOUVENEZ-VOUS

Un simple test pourrait sauver la vie de votre bébé. Faites-lui faire le test du VIH aujourd'hui-même.





PAS DE TEMPS À PERDRE !

**Protégez la vie
de vos bébés -
faites-leur
faire le test
du VIH**

En tant que parents et soignants nous voulons prendre soin de nos enfants du mieux que nous pouvons - cela inclut le fait de les protéger contre le VIH. Voici ce que vous devez savoir :

« Comment notre bébé pourrait-il contracter le VIH ? »

Les bébés peuvent entrer en contact avec le VIH pendant la grossesse, au moment de leur naissance ou pendant l'allaitement, en particulier si la mère ne sait pas qu'elle est séropositive ou si elle n'est pas sous traitement.

« Mais notre bébé est en bonne santé »

Votre bébé peut sembler en bonne santé, mais il n'y a pas toujours de symptômes au début. Le VIH est dangereux chez les jeunes enfants et ils peuvent tomber malades très rapidement. Le seul moyen de savoir avec certitude si votre bébé est séropositif est de le faire tester.

« Où pouvons-nous faire tester notre bébé ? »

Parlez-en à n'importe quel agent de santé ou conduisez votre bébé au centre de santé le plus proche et demandez le test.

« Que se passe-t-il au moment du test ? »

Un agent de santé pique le pied de votre bébé à l'aide d'une épingle et prélève une goutte de sang à analyser. Certains centres de santé peuvent vous donner les résultats le jour-même, et dans d'autres centres de santé l'échantillon est envoyé ailleurs pour être analysé et vous devez revenir plus tard pour avoir les résultats. Il est très important de récupérer les résultats pour savoir si votre bébé a le VIH.

« Et si notre bébé a le VIH ? »

Le bébé peut être mis sous traitement immédiatement. Tous les soins et les médicaments dont il aura besoin sont gratuits.

Le traitement du VIH est très efficace. Plus tôt votre enfant sera diagnostiqué, plus tôt il pourra commencer le traitement. Si votre enfant est diagnostiqué tôt et qu'il prend ses médicaments, il peut grandir et vivre longtemps, en bonne santé.

« Notre bébé a été testé et il n'a pas le VIH »

C'est une très bonne nouvelle, mais les enfants peuvent être encore exposés au VIH pendant l'allaitement. Il est important de lui faire refaire un nouveau test quand il aura 9 mois et également à la fin de la période d'allaitement.

SOUVENEZ-VOUS

Un simple test pourrait sauver la vie de votre bébé. Faites-lui faire le test du VIH aujourd'hui-même.

